



ПАМЯТКА о проведении вакцинации против COVID-19

Перед проведением вакцинации ознакомьтесь с основными правилами:

- 1 Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19.
- 2 **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:**
 - ✓ гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
 - ✓ тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
 - ✓ острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
 - ✓ обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
 - ✓ беременность и период грудного вскармливания;
 - ✓ возраст до 18 лет.
- 3 **ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ВРАЧА:**
 - ✓ измерение температуры;
 - ✓ сбор эпидемиологического анамнеза;
 - ✓ измерение сатурации (уровня насыщения крови кислородом);
 - ✓ осмотр зева.

На основании осмотра врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
- 4 **ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ В ДВА ЭТАПА:**
 - ✓ Вначале вводят внутримышечно компонент I.
 - ✓ На 21 день вводят внутримышечно компонент II.

- 5 В течение 30 мин после вакцинации необходимо оставаться в медицинской организации для наблюдения и предупреждения возможных аллергических реакций.
- 6 **В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ ОБЩИЕ СИМПТОМЫ:** озноб, повышение температуры тела, боли в суставах, в мышцах, общее недомогание, головная боль; а также местные реакции: болезненность в месте инъекции, покраснение, отёчность.
- Реже отмечаются тошнота, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.*
- 7 Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
- 8 Вакцина против COVID-19 **НЕ ОТМЕНЯЕТ** для привитого человека необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

- ✓ При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства.
- ✓ При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.



ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
www.rcmp-nso.ru

